


Indsprøjtning af fyldstof i urinrøret



Patientinformation

Denne pjece skal supplere den mundtlige information som du har modtaget i forbindelse med din beslutning om operation.

Hvornår overvejes operation for ufrivillig vandladning?

- Når urininkontinens giver hygiejniske eller sociale problemer.
- Når urininkontinens optræder i forbindelse med fysisk aktivitet, såsom løb, gang, hoste eller nys.
- Når anden behandling f.eks. bækkenbundstræning ikke har hjulpet.

Hvordan foregår operationen?

Operationen foregår i lokalbedøvelse, og du vil samtidig få smertestillende og beroligende medicin.

Ved hjælp af en lille kikkert i urinrøret indsprøjtes 2-5 ml flydende fyldstof under slimhinden i urinrøret. Fyldstoffet størkner i løbet af det første døgn og fungerer som en ny "pakning" i urinrøret.

Hvilke problemer kan operationen medføre?

- Mange får problemer med at lade vandet de første dage efter operationen, og der kan være svie ved vandladningen.
- Det kan være nødvendigt at tømme blæren med et kateter, indtil vandladningen kommer i orden.
- I sjældne tilfælde kan det blive nødvendigt, at du selv lærer at tømme blæren med et kateter.
- Der kan ofte komme blærebetændelse, som kræver antibiotisk behandling.
- Enkelte kan få ufrivillig vandladning i forbindelse med stærk vandladningstrang.

Du bør henvende dig til egen læge eller vagtlægen ved akutte problemer med din vandladning eller symptomer på blærebetændelse.

Vil jeg få smerter?

De fleste har ingen smerter efter operationen. Du kan have ømhed forneden og svie ved vandladning. Ved smerter anbefaler vi tablet Paracetamol/Pamol/Pinex/Panodil 1g max. x 4 i døgnet. Denne behandling kan evt. suppleres med tablet Ibuprofen/Ibumentin/Burana/Ipren 400 mg max. x 3 i døgnet.

Hvordan med vandladning efter operationen?

Når du får vandladningstrang eller senest 3-4 timer efter operationen, skal du have målt vandladningen og tjekket blæretømningen ved skanning. Tømmer du ikke blæren efter operationen, vil det blive nødvendigt at indlægge dig til yderligere kontrol af vandladningen på vores Gynækologiske Sengeafsnit G115.

Hvilket resultat kan jeg forvente af operationen?

Omkring 70 % helbredes eller bedres efter operationen. Der er risiko for, at der med tiden igen kan opstå ufrivillig vandladning, i så fald kan operationen gentages.

Hvordan skal jeg forholde mig efter udskrivelsen?

I løbet af den første uge kan du gradvist genoptage dine vanlige aktiviteter, bækkenbundstræning og samliv. Bruger du hormonstikpiller anbefaler vi, at du fortsætter behandlingen umiddelbart efter operationen for at styrke slimhinderne.

Hvor kan jeg ringe til ved spørgsmål?

Du er altid velkommen til at kontakte os:
Urogynækologisk klinik
(kl. 9.00-14.00)
tlf. 38 68 84 28

Venlig hilsen

Personalet
Urogynækologisk klinik
Gynækologisk Obstetrisk
Afdeling G
Herlev Hospital



**Herlev
Hospital**

Herlev Hospital
Herlev Ringvej 75
DK-2730 Herlev

Telefon: 4488 4488
www.herlevhosp.dk