


Medicinsk abort efter uge 8



Patientinformation

Medicinsk abort efter uge 8

Hvem kan få en abort?

Hvis du har bopæl i Danmark, har du ret til at få en abort inden udgangen af 12. svangerskabsuge, regnet fra den sidste menstruations første dag.

Hvis du er mere end 12 uger henne, kan du under særlige omstændigheder få en abort, hvis du får tilladelse fra Abortsamråds sekretariatet, Region H.

Hvis du er under 18 år (eller umyndiggjort), skal dine forældre (eller værge) give samtykke. Under særlige omstændigheder kan samtykke erstattes af en tilladelse fra Abortsamråds sekretariatet, Region H.

Hvad er en medicinsk abort?

Ved en medicinsk abort afbrydes graviditeten med to slags medicin.

Den første dag skal du tage en tablet (Mifegyne), som medfører, at graviditeten går til grunde. Denne tablet kan give menstruationslignende smerter og blødning, enkelte får kvalme.

Dagen efter skal der lægges 4 tabletter op i skeden (Cytotec). Tabletterne indeholder et hormon, som får livmoderen til at trække sig sammen, hvilket medfører blødning. Dette foregår under indlæggelse. Det kan være nødvendigt med yderligere medicin afhængig af virkningen.

Behandlingen kontrolleres med en blodprøve den første dag, samt en uge efter.

Dag 1. Første møde

Du skal have foretaget en blodprøve, gynækologisk undersøgelse og en ultralydsscanning, som skal afgøre, hvor langt du er henne i graviditeten. Herefter får du udleveret en tablet Mifegyne, 200 mg. Når du har indtaget den, er aborten sat i gang, og det er nødvendigt, at du gennemfører resten af behandlingen. Gennemføres graviditeten alligevel, kan medicinen medføre fosterskade.

Blødning/smerter 1. dag

Nogle kvinder begynder at bløde efter den første tablet. Blødningen er som ved menstruation, og du kan få smerter, der minder om menstrua-

tionssmerter. Hvis smerterne er kraftige, anbefaler vi, at du tager to tabletter Panodil 500 mg efter behov med seks timers mellemrum. Derudover kan du supplere med tablet Ibuprofen 200 mg. Begge præparater kan du købe på apoteket uden recept.

Dag 2. Indlæggelse

Næste dag møder du på afdeling G115. Her får du lagt 4 tabletter Cytotec á 0,2 mg op i skeden, som smertestillende behandling får du 2 tabletter Diclon á 50 mg.

Du skal være i afdelingen i nogle timer, så det er en god ide at medbringe læsestof.

Blødning/smerter 2. dag

Blødningen kan være meget kraftigere end en menstruation, og der kan være klumper i blodet. Desuden får du menstruationslignende smerter, når livmoderen begynder at trække sig sammen. Hjemme kan du supplere med 2 tabletter Panodil á 500 mg højst 4 gange i dette døgn, hvis det er nødvendigt.

Dag 3

Efter kl. 12.00 vil plejepersonalet ringe til dig for at høre, hvordan du har det.

Efter aborten

Du behøver ikke at sygemelde dig.

Blødning

Det er normalt at bløde i 10-12 dage. I starten kraftig, senere kun svag blødning. Enkelte kan bløde i op til tre uger. Mens du bløder, anbefaler vi, at du bruger bind og ikke tampon. Du kan tage brusebad, men ikke karbad, havbad eller gå i swimmingpool på grund af risiko for infektion. Det er bedst at vente med samleje, til du ikke bløder længere. Ellers er det vigtigt, at I bruger kondom. Hvis du planlægger at bruge p-piller efter aborten, skal du begynde med p-pillerne den dag, du får lagt tabletterne op i skeden.

Hvis du får feber, bløder meget kraftigt med store klumper eller får meget kraftige smerter, skal du henvende dig til din egen læge eller i skadestuen.

Dag 8

Otte dage efter kommer du igen på sygehuset og får taget en blodprøve. Den skal kontrollere, at graviditeten er helt afsluttet. Kun i få tilfælde er det nødvendigt at indkalde til en ultralydsundersøgelse og eventuelt en udskrabning. I så fald får du besked om det.

Du skal henvende dig på Klinisk Kemisk Afdeling på 4. sal kvadrat M1:

.....dag den


mellem kl. 07.30 og 12.00 for at få taget blodprøven.

Hvis du er i tvivl om noget bør du henvende dig til din praktiserende læge.

Om dagen kan du også ringe dagklinikken på telefon nr. 38 68 36 79

Efter kl. 15.00 og i weekenden kan du ringe til gynækologisk afdeling på telefon nr. 38 68 36 87

Med venlig hilsen
Personalet
Gynækologisk afdeling



**Herlev
Hospital**

Herlev Hospital
Herlev Ringvej 75
DK-2730 Herlev

Telefon: 4488 4488
www.herlevhosp.dk