


Transplantation af delhud



Patientinformation

Før operation

Operationen foregår under indlæggelse og under fuld bedøvelse. I nogle tilfælde kan operationen foregå i lokalbedøvelse og evt. ambulantly. Det er lægen, der sammen med dig tager stilling til, hvad der vil være den bedste løsning.

Se i øvrigt Patientinformation om: Indlæggelse eller Ambulantly operation.

Operationen

Der skal ved operationen fjernes så meget væv, at såret ikke kan sys direkte sammen. For at lukke såret anvendes et hudtransplantat.

Den hud, der bruges som hudtransplantat, tages oftest fra lårets forside, hvor huden er mest velegnet. Dette område kaldes donorstedet. Evt. hår på benet skal fjernes før operationen. Der vejledes herom før operationen.

Hvis operationen skal foregå i lokalbedøvelse, skal der først anvendes lokalbedøvende creme på det område, der skal anvendes som donorsted. Også

dette bliver der orienteret om før operationen.

Ved operationen afvaskes operationsområderne med desinficerende (spritholdig) væske og der pålægges sterile afdækninger.

Hudtransplantatet er meget tyndt og skæres fri, som en tynd film, med en speciel kniv. Herefter bliver donorstedet forbundet med en sugende forbindelse.

Hudtransplantatet placeres på såret, sys gerne fast i kanten og holdes på plads af en forbindelse, som evt. også sys fast.

Efter operationen

Det hudtransplanterede område og den påsyede forbindelse må ikke blive våd eller snavset. Området, hvor der er pålagt hudtransplantat, skal så vidt muligt holdes højt for at undgå væskeansamling eller blødning. Forbindingen vil blive fjernet i plastikkirurgisk afdeling eller i ambulatoriet - tidspunkt for fjernelse af forbindingen bliver aftalt på operationsdagen. Når forbindingen er fjernet,

planlægges det videre behandlings- og kontrolforløb.

Hudtransplantation på underbenet

Efter hudtransplantation på benet skal du være sengeliggende det første døgn, og du vil normalt være indlagt 1-2 dage efter operationen.

Ved større transplantationer kan indlæggelsen være længere.

Afhængig af forbindingen kan du begynde at gå forsigtigt på benet 1-5 dage efter operationen – det er størrelsen på hudtransplantatet samt din generelle fysiske tilstand og mulighed for heling, der afgør valg af forbindelse, og dermed hvornår du kan begynde at gå.

Forbindingen over hudtransplantatet bliver fjernet efter 4-5 dage og erstattes af en mindre og lettere forbindelse, som skal beskytte det endnu sarte opererede område.

Når hudtransplantatet er vokset fast og er blevet stabilt, kan forbindelse undværes.

Udseende og hudfarve

Lige efter forbindingen er fjernet er hudtransplantatet ofte

misfarvet i forhold til den omgivende hud. Dette er helt normalt og vil aftage gradvist de første uger efter hudtransplantation.

Efterhånden bliver hudens farve mere normal, men der vil som regel vedblive at være lidt forskel i hudfarven i forhold til den omgivende hud.

Den transplanterede hud er tyndere end det væv, der er fjernet. Det betyder, at der ofte er en niveauforskel mellem hudtransplantatet og huden omkring transplantatet.

Niveauforskellen vil variere afhængig af, hvor på kroppen der transplanteres hud.

Denne niveauforskel kan forekomme markant lige efter transplantationen, men vil blive mindre de efterfølgende uger til måneder.

Donorstedet

Forbindingen på donorstedet skal bibeholdes i 10-14 dage.

Du må gerne gå i brusebad med denne forbindelse, når den er tæt. Forbindingen på donorstedet kan fjernes af egen læge eller hjemmesygeplejersken.

Egen læge eller plastikkirurgisk ambulatorium skal kontaktes hvis:

- Forbindingen bliver meget væskefyldt og ikke kan suge mere blod/væsvæske, da det kan være nødvendigt at skifte donorforbindingen.
- Hvis forbindingen bliver utæt og blod/væsvæske løber/siver ud.
- Der er mistanke om infektion i form af smerte/ømhed, lugt og sivende blod/væsvæske. Der kan være behov for antibiotisk behandling.

Se i øvrigt Patientinformation om: Efterbehandling af hudtransplantat og donorsted.

Indlæggelsesvarighed

Indlæggelsen varer fra 1-6 dage

Efter udskrivelsen

Der vejledes i pleje af det hudtransplanterede område.

Måske er der behov for hjemmesygeplejerske. Dette vil blive aftalt nærmere inden udskrivelsen.

Hvis der opstår problemer med blødning, hævelse og/eller smerter omkring hudtransplantatet skal plastikkirurgisk ambulatorium kontaktes.

(Se sidste side i vejledning)

Komplikationer

Der kan - om end sjældent - opstå problemer ved en hudtransplantation.

Der kan i de første dage opstå blødning eller infektion under hudtransplantatet. Hvis dette sker, kan det kræve en ny hudtransplantation.

Der kan opstå små områder/defekter, hvor hudtransplantatet ikke vokser fast. Mindre defekter vil hele af sig selv, men større områder kan kræve en ny hudtransplantation.

Nogle patienter oplever en ubehagelig øget følsomhed i det hudtransplanterede område, men dette forsvinder normalt i løbet af få måneder.

Ambulant kontrol

Hvis du udskrives med forbinding på hudtransplantatet, vil den blive fjernet i plastikkirurgisk ambulatorium ca. 5 dage efter operationen.

Afhængig af hvordan hudtransplantatet vokser fast, vil der blive aftalt ambulant kontrol efter behov. Der vil ofte være ambulant kontrol efter 1-3 måneder.

Sygemelding

Du skal være sygemeldt 1- 4 uger (afhængig af hvor på kroppen, du er blevet hudtransplanteret).

Når hudtransplantatet er stabilt, kan arbejde genoptages. Efterbehandling og sygemelding aftales med lægen/sygeplejersken på sengeafdelingen/ambulatoriet.

Spørgsmål

Har du spørgsmål efter udskrivelsen, kan du kontakte

Kontaktsygeplejerske i
Plastikkirurgisk ambulatorium
V/A 54E7
Tlf: 44884000 + 89592
Hverdage mellem
kl. 8.00 - 10.00

eller

Plastikkirurgisk ambulatorium
V/A 54E7
Tlf: 4488 3941 Hverdage
mellem kl. 08.00 - 14.00
Med venlig hilsen

Plastikkirurgisk afdeling V



**Herlev
Hospital**

Herlev Hospital
Herlev Ringvej 75
DK-2730 Herlev

Telefon: 4488 4488
www.herlevhosp.dk