

Herlev Hospital

Gynækologisk Ambulatorium, Dagkirurgisk afsnit


Kegleoperation/konisation i fuld bedøvelse

Patientinformation

Du har fået konstateret celleforandringer på overfladen af din livmoderhals. Sådanne celleforandringer er **ikke kræft**, og stort set alle kvinder, der får konstateret celleforandringer, bliver fuldstændigt helbredt.

Forandringerne er påvist på baggrund af en celleprøve (smear) suppleret med en kikkertundersøgelse (kolposkopi), hvor der tages vævsprøver (biopsier) og et lille skrab (cervixabrasio) fra livmoderhalsen.

Celleforandringerne opstår hyppigst i overgangszonen lige ved indgangen til livmoderhalsen (se tegning).



Forandringerne kategoriseres efter, hvor udtalte de mikroskopiske forandringer er. De kaldes **forstadier** til livmoderhalskræft og opdeles i lette, moderate og svære forandringer (kaldet dysplasi) eller carcinoma in situ.

Man har en mistanke om, at celleforandringer kan være opstået på baggrund af virusinfektion (Human papillomavirus, HPV). Både virusinfektion og celleforandringer er almindeligvis symptomløse.

Behandling

Behandling af celleforandringer foregår ved kegleoperation. Indgrebet kaldes også konisation (konus = kegle).

På grund af bedøvelsen skal du møde fastende, se PATIENTINFORMATION – Dagkirurgisk Afsnit.

Hvor og hvornår skal jeg møde?

Du skal møde i Dagkirurgisk Afsnit på 4. sal, kvadrat H1

..... - dag den kl.

Med mindre der er kraftig blødning er menstruation ingen hindring for, at indgrebet kan udføres.

I Dagkirurgisk Afsnit vil du blive modtaget en sygeplejerske, som vil vise dig til rette og fortælle dig om dagens forløb.

Selve indgrebet varer ca. ½ time.

Inden udskrivelsen skal du have været oppe at gå, haft vandladning samt talt med den læge, som har opereret dig.

Efter indgrebet

Det er meget sjældent, at man egentlig får smerter i efterforløbet.

På operationsdagen bør du kunne dække evt. ubehag med almindelig smertestillende medicin (Panodil).

Der kan forekomme små blødninger eller brunligt, vandigt evt. ildelugtende udflåd i op til et par uger.

10-14 dage efter operationen kan der komme lidt frisk blødning i forbindelse med at sårskorpen løsnes og afstødes.

Hvis du får frisk blødning, kraftigere end menstruation, feber og smerter i underlivet skal du søge læge.

I dagtimerne kan du henvende dig til gynækologisk ambulatorium på tlf. 38 68 37 37 eller kontakte vagthavende gynækolog på tlf. 38 68 38 68 personsøger 82 546.

Forholdsregler

Efter indgrebet bør du være sygemeldt fra 2 til 5 dage - afhængig af dit arbejde. I denne periode skal du tage det roligt og undgå at løfte tunge ting.

Du bør ligeledes undgå samleje i perioden med blødning, det vil sige 2-3 uger.

Med henblik på at forebygge infektion frarådes du at anvende tamponer. Svømning og karbad må i samme periode ikke benyttes.

Efter 3-6 uger er livmoderhalsen helet op og ny slimhinde dækker området, hvorfra keglen er fjernet.

Kegleoperationen har ingen indflydelse på det seksuelle samliv, og muligheden for at blive gravid og gennemføre graviditet er ikke forringet.

Opfølgning

Det fjernede væv sendes til mikroskopisk undersøgelse. Her undersøges det, om forandringerne er fjernet i sundt væv.

Ca. 2-3 uger efter indgrebet vil du kunne forvente svar på den mikroskopiske undersøgelse. Du aftaler med læge, som behandler dig, om du skal have skriftligt svar eller om du skal komme i ambulatoriet til svar.

Det videre undersøgelses-/behandlingsforløb afhænger af, om dit mikroskopisvar ligger indenfor nedenstående svarmulighed 1 eller 2.

1. Forandringerne er fjernet i sundt væv

Du skal kontrolleres med celleprøve (smear) hos din egen læge efter 6 måneder og herefter årligt i 5 år. Derefter som normalt: hvert 3.år.

2. Forandringerne når ud til kanten af keglen

Du skal komme til kontrolundersøgelse i Gynækologisk ambulatorium efter 3 måneder. Afhængig af celleforandringernes udstrækning skal du have foretaget nye vævsprøver i form af smear og/eller vævsprøver fra livmoderhalsen.

Selv om forandringer når ud til kanten af keglen, vil man i de fleste tilfælde alligevel være helbredt. De sidste restforandringer er som regel brændt væk ved slutningen af indgrebet.

Yderligere information.

Kræftens Bekæmpelses pjecer: "Celleforandringer" og "Forebyggende undersøgelse for livmoderhalskræft".

Internetadresserne: **www.netdoktor.dk** og **www.sundhed.dk**

Ønsker du yderligere information, er du velkommen til at kontakte Gynækologisk ambulatorium i dagtimerne på tlf. 38 68 37 37.

Med venlig hilsen

Personalet i Gynækologisk Ambulatorium

Personalet i Dagkirurgisk Afsnit 54H1

