


Fuldhudstransplantation



Patientinformation

Før operation

Operationen foregår oftest ambulant og i lokalbedøvelse.

Du må derfor gerne spise og drikke før operationen.

I specielle tilfælde kan operationen foregå under indlæggelse og under fuld bedøvelse, hvorfor du så skal være fastende 6 timer før operationen.

Se i øvrigt Patientinformation om ambulant operation.

Operationen

Ved operationen skal der fjernes så meget væv, at såret ikke kan sys direkte sammen. Såret må derfor dækkes med et stykke transplanteret hud.

For at resultatet skal blive så pænt som muligt, anvendes et fuldhudstransplantat, som består af alle hudens lag (dog ikke underhudsfedt).

Ved operationen afvaskes operationsområderne med desinficerende (spritholdig) væske og der pålægges sterile afdækninger. Lokalbedøvelse sprøjtes ind i huden med en tynd kanyle.

Den hud, der bruges som hudtransplantat, tages oftest fra

området ved kravebenet på halsen eller ved øret. Dette område kaldes donorstedet. Her er huden løs og området/såret, hvor hudtransplantatet er taget fra, kan herefter syes direkte sammen.

Det er lægen, der sammen med patienten vurderer hvilket område, der er bedst egnet som donorsted.

Hudtransplantatet bliver syet fast på operationssåret og holdes på plads af en forbindelse, som også sys fast.

Efter operationen

Hudtransplanteret område

Hudtransplantatet og den påsyede forbindelse må ikke blive våd eller snavset. Området, hvor der er pålagt hudtransplantat skal holdes højt for at undgå væskeansamling eller blødning.

Forbindingen på hudtransplantatet skal fjernes efter 4-5 dage. Dette vil foregå i plastikkirurgisk ambulatorium.

Tidspunkt for fjernelse af forbindingen bliver aftalt på operationsdagen.

Herefter planlægges det videre forløb.

Lige efter forbindingen er fjernet, er hudtransplantatet ofte mørkere end den omkringliggende hud. Dette er helt normalt og vil aftage gradvist de første uger efter operationen. Efterhånden som hudtransplantatet vokser fast, kan forbindelse undværes. Efter 10-14 dage er transplantatet vokset solidt fast.

Donorstedet

Forbindingen (tyndt plaster) over donorstedet skal bibeholdes til trådene skal fjernes efter 10-14 dage. Området skal holdes tørt det første døgn. Såfremt der ved operationen anlægges sugende/komprimerende forbindelse på donorstedet kan denne fjernes efter 1-2 dage efter nærmere aftale med lægen. Trådene ved donorstedet fjernes af egen læge med mindre andet aftales ved operationen.

Sygemelding

Eventuel kontrol og sygemelding aftales med lægen på operationsdagen.

Spørgsmål

Hvis der opstår problemer med blødning, hævelse og/eller smerter omkring transplantatet kan du kontakte

Kontaktsygeplejerske i
Plastikkirurgisk ambulatorium
V/A 54E7
Tlf: 44884000 + 89592
Hverdage mellem
kl. 8.00 - 10.00

eller

Plastikkirurgisk ambulatorium
V/A 54E7
Tlf: 4488 3941
Hverdage mellem
kl. 08.00 - 14.00

Med venlig hilsen

Plastikkirurgisk afdeling V



**Herlev
Hospital**

Herlev Hospital
Herlev Ringvej 75
DK-2730 Herlev

Telefon: 4488 4488
www.herlevhosp.dk